

Para más información puede comunicarse con la Oficina de Epidemiología e Investigación, ubicada en la Oficina #159, Edificio A, Departamento de Salud al teléfono 787-765-2929 ext. 3552 / 3556 y sus oficinas regionales:

- Región Aguadilla 787-882-9092
- Región Arecibo 787-879-3246
- Región Bayamón 939-225-2098
- Región Caguas 787-635-0550 ext.1170
- Región Fajardo 787-801-5922
- Región Mayagüez 787-832-3640
- Región Metropolitana 787-751-8381
- Región Ponce 787-844-4682

Enero 2007

Aprobado por la Comisión Estatal de Elecciones  
CEE-SA-



Estado Libre Asociado de Puerto Rico  
Departamento de Salud

## **GASTROENTERITIS**

## **GASTROENTERITIS**

La gastroenteritis es una inflamación del estómago y los intestinos causada por un virus (Rotavirus). La enfermedad es esporádica (ocurre de vez en cuando) en los niños lactantes y de corta edad, a menudo grave.

### **¿Cuáles son los síntomas?**

- Vómitos y fiebre
- Diarrea acuosa que a veces ocasiona deshidratación.
- Los síntomas persisten entre cuatro a seis días, en promedio.

### **¿Cómo se transmite?**

- Por la vía fecal-oral (contacto con la excreta de una persona infectada con el virus).
- Es un problema potencial en poblaciones de refugiados.

### **Período de incubación (período entre el contagio y los primeros síntomas)**

- De 24 a 72 horas, aproximadamente.

### **Periodo de transmisibilidad**

- Durante la fase aguda de la enfermedad, y más tarde mientras persista la excreción y dispersión de virus.

### **Medidas preventivas**

- Las personas que cuiden los niños lactantes deben lavarse las manos con frecuencia.
- Eliminación sanitaria de los pañales.
- Colocar material absorbente encima de los pañales para que no se disperse el excremento.
- Lavar las superficies con agua y cloro.