



COMUNICADO DE PRENSA

Jueves, 26 de marzo de 2015

Contactos:
Jillian Oliveras Maldonado
787-307-0257

EXHORTAN A DETECTAR Y TRATAR LA TUBERCULOSIS

San Juan, PR- Dentro del marco de la Semana Mundial de la Tuberculosis, el Departamento de Salud exhortó a los profesionales de la salud a considerar la tuberculosis (TB) en diagnósticos diferenciales e identificar la condición en sus etapas tempranas.

La Secretaria de Salud, Ana Ríos Armendáriz, resaltó el hecho de que un resultado negativo a una prueba de tuberculina o a pruebas bacteriológicas no se debe utilizar para descartar un diagnóstico de TB si el paciente está presentando otros indicadores de enfermedad como síntomas, evidencia radiológica y mejoría ante un tratamiento con medicamentos antituberculosos.

“Hoy en día, la TB es una enfermedad prevenible y sanable. Sin embargo, el 18 por ciento de los casos reportados en Puerto Rico durante el 2014 murieron durante el tratamiento, lo que nos sugiere que el diagnóstico se está dando cuando la enfermedad ya se encuentra en una etapa más avanzada”, expresó la Epidemióloga del Estado, Brenda Rivera García.

A nivel de Estados Unidos, se estima que un 15 a 20 por ciento de los casos de TB no son diagnosticados por pruebas biológicas y necesitan ser confirmados clínicamente. En Puerto Rico, la proporción de diagnósticos clínicos siempre ha sido baja, es por esto que el Programa para el Control de la Tuberculosis del Departamento de Salud está trabajando activamente para aumentar el nivel de sospecha y diagnóstico entre los profesionales de salud, orientando a sobre mil profesionales en el tema.



“Estamos muy complacidos con los resultados de estos esfuerzos pues el año calendario ha representado un aumento de un 20 por ciento, en comparación con el primer trimestre del 2014, en la cantidad de casos de TB diagnosticados clínicamente. Estos logros son el resultado de la colaboración entre la comunidad médica y el programa”, puntualizó Rivera García.

La salubrista explicó que aunque la TB puede tocarle a cualquier persona, ya que la misma se transmite por el aire, existen varios grupos de alto riesgo:

- ✓ Personas que han estado en contacto reciente y cercano con una persona con TB activa
- ✓ Personas que han nacido o han pasado un tiempo prolongado en países con alta incidencia de TB (Caribe, Centro y Sur América, África y Asia)
- ✓ Personas con Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) o un sistema inmunológico comprometido
- ✓ Personas que presenten síntomas como tos persistente por tres semanas o más, cansancio, sudoraciones nocturnas, pérdida de apetito y pérdida de peso sin causa aparente

El Programa de Control de la Tuberculosis del Departamento de Salud está disponible no sólo para el reporte de casos sino para atender cualquier duda o consulta acerca del posible diagnóstico de un paciente comunicándose al 787-765-2929 x 3861.

Queremos resaltar que el curso *Tuberculosis 101 para profesionales de la salud* de los CDC está disponible en el siguiente enlace: www.cdc.gov/tb/esp/webcourses/tb101/default.htm El mismo ofrece información acerca de la transmisión, desarrollo, diagnóstico y tratamiento de infección latente y enfermedad activa.

###