


# Flujograma muestras para Zika

## Mujeres embarazadas





## Instrucciones para el cernimiento de Zika en mujeres embarazadas

### Mujeres embarazadas CON síntomas de Zika:

- Si una mujer embarazada presenta con síntomas de Zika en cualquier momento del embarazo, refiérala para una prueba de Zika. Los síntomas más frecuentes son fiebre, sarpullido, dolor articular y conjuntivitis (no purulenta).
- Utilice el formulario de investigación de caso arboviral 2016 y anote toda la información pertinente incluyendo: información de contacto del médico que refirió la mujer embarazada para la prueba y del obstetra de la mujer si es diferente al médico que ordenó la prueba; semana de gestación; indique que la mujer es sintomática; marque los síntomas, y fecha de comienzo de síntomas.
  - Envíe a la paciente con el formulario de investigación de caso arboviral 2016 a un laboratorio que tiene servicios de referencia con los Laboratorios Toledo o Laboratorios Quest. Estas compañías estarán a cargo del transporte de muestras al Departamento de Salud libre de costo. El listado de laboratorios participantes estará en la página de web del Departamento de Salud. Ver <http://www.salud.gov.pr/Sobre-tu-Salud/Pages/Condiciones/Zika.aspx#proveedores>
- El resultado será enviado por correo electrónico o fax al médico que refiere a la paciente y a su obstetra o médico primario si es diferente al médico que ordenó la prueba. Asegúrese de anotar en el formulario de investigación de caso de arbovirus 2016: su nombre, número de NPI (Identificador Nacional de Proveedor), correo electrónico, fax, y nombre del hospital o clínica y el nombre, teléfono, y hospital o clínica del obstetra de la paciente.
- Pacientes con resultados negativos deben ser orientados sobre los métodos para la prevención de la infección por Zika. Vea información sobre prevención de Zika del DS o CDC: [www.salud.gov.pr](http://www.salud.gov.pr); [www.cdc.gov/zika/prevention/](http://www.cdc.gov/zika/prevention/).
- Si recibe un resultado indeterminado, refiera la paciente para una segunda muestra (muestra convaleciente) después del séptimo día de síntomas.
- Mujeres embarazadas con resultados positivos al virus del Zika deben ser orientadas sobre lo que se sabe y no se sabe de los riesgos al feto. Además el obstetra debe seguir las recomendaciones de las guías interinas para el seguimiento clínico de mujeres embarazadas infectadas con Zika. Ver información disponible en la página web de CDC:
  - Preguntas y respuestas - <http://www.cdc.gov/zika/pregnancy/question-answers.html>
  - CDC. Update: Interim Guidelines for Health Care Providers Caring for Pregnant Women and Women of Reproductive Age with Possible Zika Virus Exposure — United States, 2016. MMWR. February 12, 2016 / 65(05);122–127. Ver recomendaciones: <http://www.cdc.gov/mmwr/volumes/65/wr/mm6505e2.htm>.

### Mujeres embarazadas SIN sintomatología de Zika:

- El cernimiento para Zika en mujeres embarazadas sin síntomas será implementado de manera escalonada de acuerdo a la propagación del virus en la Isla. Se debe realizar una prueba del Zika a mujeres embarazadas asintomáticas en el primer trimestre y si el resultado es negativo, se debe hacer durante el segundo trimestre del embarazo en áreas de la Isla donde se ha documentado la transmisión del virus. Manténgase informado a través de la página web del departamento de salud sobre la propagación de casos infectados en las regiones de salud en la Isla. Encuentre el reporte semanal: <http://www.salud.gov.pr/Estadisticas-Registros-y-Publicaciones/Pages/Informe-Arboviral.aspx>.
- Utilice el Formulario de Investigación de Caso Arboviral 2016 y anote toda la información pertinente incluyendo: información de contacto del médico que refirió la mujer embarazada para la prueba y del obstetra de la mujer si es diferente al médico que la refirió para la prueba; semana de gestación; indique que la mujer no es sintomática.
- Envíe a la paciente con el Formulario de Investigación de Caso Arboviral 2016 a un laboratorio que tiene servicios de referencia con los laboratorios Toledo o laboratorios Quest. Estas compañías estarán a cargo del transporte de muestras al Departamento de Salud libre de costo. El listado de laboratorios participantes estará en la página de web del Departamento de Salud. <http://www.salud.gov.pr/Sobre-tu-Salud/Pages/Condiciones/Zika.aspx#proveedores>
- El resultado será enviado por correo electrónico o fax al médico que refiere a la paciente y a su obstetra si es diferente al médico que la refirió. Asegúrese de anotar en el Formulario de Investigación de Caso Arboviral 2016 su nombre, número de NPI (Identificador Nacional de Proveedor), correo electrónico y/o fax y el nombre, teléfono, del obstetra de la paciente.
- Si el resultado es negativo en el primer trimestre, se debe repetir la prueba de Zika a mediados del segundo trimestre.
- Aconseje a la paciente sobre medidas de prevención según lo descrito arriba (<http://www.cdc.gov/zika/prevention/index.html>).