

¿Qué las hace vulnerables?



Agresión Sexual y Mujeres con Impedimentos

- ◆ A las mujeres con impedimentos de temprana edad se les enseña a complacer en vez de a ser asertivas.
- ◆ No conocen sus propios cuerpos.
- ◆ Se les enseña a obedecer a figuras de autoridad (doctores, cuidadores/as, policías)
- ◆ A menudo dependen del/de la agresor/a para su cuidado personal
- ◆ Debido a la falta de educación sexual, se les puede dificultar distinguir entre toques adecuados y no adecuados
- ◆ Sus decisiones usualmente no son respetadas. Muchas veces un "NO" no significa "NO"
- ◆ Temen ser castigadas según amenazas de pérdida de cuidado, medicinas u hogar
- ◆ Físicamente podrían estar menos capacitadas para resistir o escapar de un/a agresor/a
- ◆ Usualmente están aisladas (falta de apoyo o amistades), creando un deseo mayor de conocer y compartir con otros/as
- ◆ Enfrentan valores sociales negativos de ser inferior, lo que puede llevar a agresores/as a pensar que el abuso es "permitido"

Adaptado de: Domestic Violence Initiative

CAVV-San Juan

(787) 765-2412, (787) 756-0910,

(787) 756-0920, (787) 756-0930

Fax (787) 765-7840

CAVV-Arecibo

(787) 817-3054, (787) 817-3464

Fax (787) 817-3414

CAVV-Caguas

(787) 745-0808, (787) 745-0809

Fax (787) 745-7680

CAVV-Fajardo

(787) 860-2889, (787) 863-4898

Fax (787) 863-4946

CAVV-Mayagüez

(787) 834-1648 ext. 231, (787) 833-7140

Fax (787) 834-1346

CAVV-Ponce

(787) 842-3315, (787) 504-2657

Fax (787) 290-3939

Centro de Ayuda a Víctimas de Violación (CAVV)



Agresión Sexual en Mujeres con Impedimentos

Las mujeres con impedimentos tienen derecho a una vida sin agresión o abuso sexual. Generalmente, la agresión sexual en mujeres con impedimentos es llevado a cabo por un/a conocido/a i.e. pareja íntima, cuidador/a, familiar, doctor u otro. Muchas sobrevivientes experimentan presión extrema por parte de su agresor/a través de la intimidación y amenazas de eliminar cuidado, comida, medicamentos u hogar. La agresión sexual involucra dinámicas de poder y control y; a menudo, las mujeres con deficiencias son vulnerables dada su necesidad de apoyo de otros/as.

A las mujeres jóvenes con deficiencias, especialmente deficiencias en el desarrollo, usualmente no se les educa sobre la sexualidad, auto protección, toques adecuados vs, no adecuados o el hecho de que tienen derecho a decir "no". En vez, se les enseña a complacer y no se les permite autonomía sobre sus propios cuerpos. No se les otorga protección y se consideran testigos no-confiables a su favor.

La sociedad equivocadamente cree que las mujeres con deficiencias son "asexuales", no atractivas o que están protegidas. En ocasiones, la sociedad ve a las mujeres con deficiencias como "dañadas" y ; en muchas ocasiones, ignora o sobre reacciona a relatos de agresión o abuso sexual, ocasionando que la sobreviviente se retracte o niegue que la agresión ocurrió, evitando así ser objeto de atención no deseada.



Señales de agresión o abuso sexual

Físicas

- ◆ Moretones en área genital
- ◆ Incomodidad en área genital
- ◆ Infecciones de transmisión sexual
- ◆ Señales de abuso físico
- ◆ Ropa rota o extraviada
- ◆ Embarazo inesperado

Conductuales

- ◆ Depresión
- ◆ Abuso de sustancias
- ◆ Aislamiento
- ◆ Apego atípico
- ◆ Evita lugares específicos
- ◆ Convulsiones
- ◆ Evita ciertos adultos/as
- ◆ Episodios de llanto excesivos
- ◆ Conducta regresiva
- ◆ Disturbios del sueño
- ◆ Divulgación de abuso
- ◆ Pobre auto-estima
- ◆ Falta de compromiso
- ◆ Trastornos alimentarios
- ◆ Resistencia a exámenes
- ◆ Conducta auto-destructiva
- ◆ Dolores de cabeza
- ◆ Dificultades en el aprendizaje
- ◆ Conducta sexual inapropiada

Mujeres en mayor riesgo

- ◆ Mujeres con múltiples impedimentos
- ◆ Mujeres con deficiencias en el desarrollo
- ◆ Mujeres con deficiencias en la comunicación
- ◆ Mujeres incapacitadas durante el nacimiento o niñez temprana

Preocupaciones

- ◆ Sobrevivientes con impedimentos en ocasiones no pueden ser tratadas con medicamentos preventivos para VIH o de embarazo por posible interacción con otros medicamentos
- ◆ Sobrevivientes con deficiencias podrían experimentar daños adicionales durante la agresión sexual i.e. remoción forzada de catéter, fracturas, convulsiones 'shock' médico tardío (diabetes)
- ◆ Pueden requerir técnicas de entrevista dirigidas a su percepción sensorial y memoria (color, sabor, sonidos, tacto)
- ◆ Pueden requerir materiales especiales (Braille, audio-cassettes, intérprete de señas y otros)
- ◆ Si el/la agresor/a es el/la cuidador/a, necesitará un reemplazo